ЛП-№(016747)-(РГ-RU) от 29.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Аллергарда, 80 мкг / 0,5 мл, суспензия для подкожного введения

Вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы, рекомбинантная, адсорбированная

▼ Данный лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу. Это позволит быстро выявить новую информацию по безопасности. Мы обращаемся к специалистам системы здравоохранения с просьбой сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях.

Способ сообщения о нежелательных реакциях описан в разделе 4 листка-вкладыша.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Аллергарда, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Аллергарда.
3. Применение препарата Аллергарда.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Аллергарда.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Аллергарда, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Аллергарда является антиген AB-PreS рекомбинантный.

Действующее вещество – антиген AB-PreS рекомбинантный, представляет собой белок-антиген, состоящий из пептидов Bet v1 (мажорный аллерген пыльцы березы) и Mal d1 (мажорный аллерген яблока), а также PreS-белка вируса гепатита В в качестве иммунного носителя, и производимый при помощи технологии рекомбинантной ДНК в специализированном штамме-продуценте *E.coli*.

Препарат предназначен для предупреждения возникновения аллергического ринита, в том числе с конъюнктивитом, у пациентов с повышенной чувствительностью к пыльце березы.

Показания к применению

Препарат Аллергарда применяется у взрослых в возрасте старше 18 лет для проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) пациентам с сенсибилизацией к пыльце березы, проявляющейся аллергической реакцией 1 типа (IgE-опосредованная) в виде ринита, в том числе с конъюнктивитом.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

2. О чем следует знать перед применением препарата Аллергарда

Противопоказания

Не применяйте препарат Аллергарда:

- если у Вас ранее была аллергическая реакция на действующее вещество или на любое из вспомогательных веществ препарата Аллергарда, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас имеется какое-либо аутоиммунное или иммунокомплексное заболевание или первичные и вторичные иммунодефициты;
- если у Вас есть сердечно-сосудистое заболевание или иная патология, при которой противопоказано введение эпинефрина в случае развития анафилаксии;
- если у Вас было выявлено злокачественное новообразование или заболевание крови;
- если Вам проводится лечение бета-адреноблокаторами, включая топические формы для местного применения: глазные капли, гели, мази (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
- если у Вас неконтролируемая или тяжелая бронхиальная астма (FEV1 менее 70% на фоне адекватной фармакотерапии);
- если у Вас в прошлом был анафилактический шок при проведении АСИТ;
- если у Вас обострение основного заболевания;
- если у Вас острое инфекционное или неинфекционное заболевание или обострение хронического заболевания;
- если Вам проводится лечение трициклическими антидепрессантами и ингибиторами моноаминоксидазы (применяются для лечения депрессии).

Особые указания и меры предосторожности

Препарат Аллергарда ни при каких случаях не допускается вводить в сосудистое русло.

Перед применением препарата Аллергарда проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите своему врачу до начала проведения аллерген-специфической иммунотерапии:

- если у Вас острое инфекционное заболевание;
- если у Вас хроническое заболевание в стадии обострения или декомпенсации.

Реакции гиперчувствительности

При проведении АСИТ препаратом Аллергарда существует риск развития реакций гиперчувствительности вплоть до анафилактического шока. Аллергические и анафилактические реакции могут развиться при любом введении препарата.

Немедленно сообщите врачу, если у Вас появятся симптомы анафилактической реакции (см. раздел 4. «Серьезные нежелательные реакции»).

После проведения инъекции Вам нужно будет оставаться под наблюдением медицинского персонала как минимум 1 час (рекомендуется наблюдение в течение 6 часов).

Вакцинация

Сообщите своему врачу, если Вы планируете или Вам проведена вакцинация живыми или инактивированными вакцинами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Терапию препаратом Аллергарда не следует проводить одновременно с вакцинацией живыми или инактивированными вакцинами, как вирусными, так и бактериальными.

Диагностические тесты на гепатит В

Сообщите своему врачу о терапии препаратом Аллергарда, если Вам необходимо провести диагностические тесты на гепатит В. На фоне терапии препаратом Аллергарда возможно появление ложноположительного результата. В случае выявления антител к HBsAg после АСИТ препаратом Аллергарда необходимо провести дополнительные диагностические тесты. Перед проведением АСИТ врач уточнит у Вас наличие инфицирования гепатитом В и статус предыдущей вакцинации против гепатита В.

Обострение основного заболевания

На фоне проведения АСИТ препаратом Аллергарда возможно проявление симптомов основного заболевания: покраснение и зуд век, выделения из носа, заложенность носа. Данная симптоматика обычно появляется после первого введения и уменьшается на фоне лечения.

Ваш лечащий врач подскажет Вам, как справиться с возникшими симптомами.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Аллергарда

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарства.

Обязательно сообщите врачу, что Вы принимаете:

- бета-адреноблокаторы (применяются для снижения артериального давления);
- трициклические антидепрессанты и ингибиторы моноаминоксидазы (применяются для лечения депрессии).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что можете быть беременны или планируете беременность, перед началом применения препарата сообщите об этом лечащему врачу, как только станет возможным.

Не следует начинать лечение препаратом Аллергарда во время беременности. Если беременность наступила на фоне начавшегося лечения препаратом Аллергарда, введение последующих доз следует прекратить.

Неизвестно, выделяется ли препарат Аллергарда с грудным молоком. Поэтому риск для новорожденных и грудных детей не может быть исключен. Решение о начале лечения препаратом Аллергарда или прекращении грудного вскармливания должно приниматься с учетом пользы терапии для матери и пользы грудного вскармливания для ребенка.

Препарат Аллергарда содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну вводимую дозу 0,5 мл, то есть, по сути, не содержит натрия.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по изучению влияния препарата Аллергарда на способность управлять транспортными средствами и механизмами не проводились. Ввиду того, что при проведении

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

инъекции возможно развитие головокружения или сонливости, следует избегать управления транспортными средствами или работать с механизмами в день проведения инъекции.

3. Применение препарата Аллергарда

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Курс АСИТ препаратом Аллергарда будет состоять из 5 подкожных инъекций в дозе 80 мкг (0,5 мл) проведенных с интервалом в 4 недели (1 инъекция 1 раз в 4 недели).

Важно вводить препарат через установленные временные интервалы.

Лечение препаратом Аллергарда следует начинать заранее, чтобы завершить курс терапии до предполагаемого начала пыления березы.

Путь и способ введения

Препарат будет вводиться глубоко подкожно по 0,5 мл суспензии в среднюю треть плеча.

Не вводить в сосудистое русло!

АСИТ выполняется только медицинским работником, имеющим опыт проведения этого лечения.

Если Вам ввели препарата Аллергарда больше, чем следовало

Доза препарата рассчитывается медицинским работником. Если Вы считаете, что Вам ввели больше препарата, чем следовало, обсудите это с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Аллергарда может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Серьезные нежелательные реакции

Некоторые нежелательные реакции могут быть **очень серьезными и опасными для жизни**. При возникновении таких реакций требуется неотложная медицинская помощь, а в ряде случаях – отмена препарата.

Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникли следующие симптомы серьезной нежелательной реакции:

Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:

- аллергическая реакция, включающую зуд, сыпь, в том числе по типу крапивницы, затрудненное дыхание или глотание, головокружение, ощущение сильного сердцебиения или низкое артериальное давление – признаки острой аллергической реакции (анафилактическая реакция).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Аллергарда:

Очень часто – могут возникать более чем у 1 человека из 10:

- заложенность носа;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- покраснение кожи (эритема);
- покраснение (эритема) в месте введения, отек в месте введения, боль в месте введения, зуд в месте введения, сыпь в виде красных выступающих пятен (крапивница) в месте введения;
- положительный результат исследования на антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В.

Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:

- головная боль, повышенная сонливость (сомнолентность);
- зуд в глазу;
- зуд в ухе;
- обильные выделения из носа (ринорея), чихание, першение в горле, затруднение носового дыхания (назальная обструкция), зуд в носу, кашель, нарушения бронхиальной проходимости и затруднение дыхания (бронхиальная обструкция), одышка, раздражение горла;
- боль в животе;
- зуд, зуд в веках, сыпь в виде красных выступающих пятен (крапивница), отек губ;
- боль в конечности, мышечная боль (миалгия);
- небольшой бугорок в месте введения (папула), образование уплотнения, отека или волдыря в месте инъекции (транссудация в месте инъекции), уплотнение в месте введения, повышение температуры тела выше нормальных значений (пирексия), недомогание, периферический отек, накопление в организме избыточного тепла или перегрев, что сопровождается повышением температуры тела (гипертермия), общая слабость (астения), озноб, отек слизистых оболочек, чувство дискомфорта в месте введения.

Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:

- головокружение, дискомфорт в голове;
- покраснение (гиперемия) глаз, повышенное (гиперсекреторное) слезоотделение, дискомфорт в глазах;
- покраснение (эритема) глотки, воспаление слизистой оболочки носа (ринит), дискомфорт в полости рта и глотки (орофарингеальный дискомфорт), снижение чувствительности глотки (гипестезия глотки), нарушение голосовой функции (дисфония), заложенность дыхательных путей;
- диарея, тошнота;
- дерматит атопический, отек лица, периоральный дерматит, сыпь, сыпь макулезная;
- боль в суставах (артралгия);
- вялость, изменение цвета тканей в месте введения, ощущение жара, усталость;
- повышение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений;
- повышение уровня ревматоидного фактора, повышение уровня С-реактивного белка в анализе крови.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Сообщения о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Аллергарда

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона и картонной пачке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 ºС в оригинальной упаковке (пачке картонной) для защиты от света. Не замораживать.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Аллергарда содержит

Действующим веществом является антиген AB-PreS рекомбинантный.

Каждый флакон содержит 0,5 мл суспензии для подкожного введения.

1 доза (0,5 мл) содержит:

Антиген AB-PreS рекомбинантный[1, 2, 3] 80 мкг.

[1] Состоит из пептидов Bet v1 (мажорный аллерген пыльцы березы) и Mal d1 (мажорный аллерген яблока), а также PreS-белка вируса гепатита В в качестве иммунного носителя;

[2] Получен из клеток Escherichia coli по технологии рекомбинантной ДНК;

[3] Антиген AB-PreS рекомбинантный адсорбирован на алюминия гидроксиде (0,6 мг Al).

Прочими вспомогательными веществами являются алюминия гидроксид, трис(гидроксиметил)аминометан, сахароза, полисорбат 80, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Внешний вид препарата Аллергарда и содержимое упаковки

Суспензия для подкожного введения.

Суспензия серовато-белого цвета, при стоянии разделяется на бесцветную прозрачную жидкость и рыхлый осадок белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

По 0,5 мл (1 доза) лекарственного препарата во флаконы формата 2R из стекла 1-го гидролитического класса, укупоренные пробками бромбутиловыми с обкаткой колпачками алюминиево-пластиковыми с контролем первого вскрытия.

1 флакон с лекарственным препаратом вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона. Для контроля первого вскрытия клапаны пачки фиксируют самоклеящимися этикетками.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «ГЕНЕРИУМ»

Владимирская обл., район Петушинский, п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 273

Тел. +7 (49243) 72-5-20, 72-5-14

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «ГЕНЕРИУМ»

601125, Владимирская обл., район Петушинский, п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 273

Тел. +7 (49243) 72-5-20, 72-5-14

Адрес электронной почты: generium@generium.ru

Препарат зарегистрирован по процедуре «условная регистрация». Это значит, что появятся новые сведения о препарате.

Представленные данные о лекарственном препарате будут проверяться и дополняться новыми сведениями ежегодно, и по мере необходимости листок-вкладыш будет обновляться.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

(линия отрыва или отреза)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников

Режим дозирования и способ применения

АСИТ должна выполняться только медицинским работником, имеющим опыт проведения этого лечения. Подкожные инъекции препарата Аллергарда должны проводиться только в медицинском учреждении, где имеется необходимое оснащение для проведения экстренных

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

реанимационных мероприятий, и в присутствии надлежащим образом обученного персонала для оказания квалифицированной помощи при неотложных состояниях.

Режим дозирования

Курс АСИТ препаратом Аллергарда состоит из 5 подкожных инъекций препарата в дозе 80 мкг (0,5 мл) проведенных с интервалом в 4 недели (1 инъекция 1 раз в 4 недели).

Важно вводить препарат через установленные временные интервалы.

Лечение препаратом Аллергарда следует начинать не позднее, чем за 5-6 месяцев до предполагаемого начала сезона пыления березы.

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста

Ограничений в применении препарата Аллергарда у пациентов пожилого возраста нет. Коррекции дозы не требуется. Решение о лечении препаратом Аллергарда пациентов пожилого возраста должно приниматься с учетом сопутствующей патологии.

Пациенты с почечной недостаточностью

Коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек не требуется.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Коррекции дозы у пациентов с нарушением функции печени не требуется.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Аллергарда у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Препарат вводится по 0,5 мл суспензии глубоко подкожно в среднюю треть плеча.

Не вводить в сосудистое русло!

Особые указания и меры предосторожности при применении

Препарат Аллергарда ни при каких случаях не допускается вводить в сосудистое русло.

Прослеживаемость

Для улучшения прослеживаемости биологических лекарственных препаратов необходимо точно документировать в медицинской документации пациента наименование применяемого лекарственного препарата Аллергарда и номер серии.

Реакции гиперчувствительности

При проведении АСИТ препаратом Аллергарда существует риск развития реакций гиперчувствительности вплоть до анафилактического шока. Аллергические и анафилактические реакции могут развиться на любом этапе введения препарата.

После проведения инъекции пациент должен оставаться под наблюдением медицинского персонала как минимум 1 час (рекомендуется наблюдение в течение 6 часов).

Подкожные инъекции препарата Аллергарда должны проводиться только в медицинском учреждении, где имеется необходимое оснащение для проведения экстренных реанимационных мероприятий, и в присутствии надлежащим образом обученного персонала для оказания квалифицированной помощи при неотложных состояниях. Кабинет, в котором проводится АСИТ, должен быть оснащен набором препаратов для оказания первой медицинской помощи (например, эпинефрином, кортикостероидами, антигистаминными препаратами и бета-адреномиметиками и др.). Должна быть предусмотрена возможность

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

быстрой транспортировки пациента в отделение интенсивной терапии при необходимости проведения экстренных реанимационных мероприятий.

При появлении анафилактической реакции дальнейшее введение препарата Аллергарда следует прекратить.

Сопутствующие заболевания

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата Аллергарда пациентам, имеющим сопутствующие заболевания. Не стоит начинать лечение при наличии острых инфекционных заболеваний, хронических заболеваний в стадии обострения или декомпенсации.

Вакцинация

Терапию препаратом Аллергарда не следует проводить одновременно с вакцинацией живыми и инактивированными вакцинами.

Диагностические тесты на гепатит В

В состав действующего вещества препарата Аллергарда входит PreS-белок вируса гепатита В в качестве иммунного носителя. У пациентов, получивших инъекции препарата Аллергарда, возможно появление ложноположительных реакций на гепатит В в виде наличия анти-HBsAg антител (см. раздел 4.8). В случае выявления антител к HBsAg после АСИТ препаратом Аллергарда необходимо провести дополнительные диагностические тесты. Врачам, проводящим АСИТ препаратом Аллергарда, необходимо предупреждать об этом пациентов, а те в свою очередь должны информировать своего лечащего врача. Перед проведением АСИТ следует уточнить у пациента наличие инфицирования гепатитом В и статус предыдущей вакцинации против гепатита В.

Обострение основного заболевания

На фоне проведения АСИТ препаратом Аллергарда возможно проявление симптомов основного заболевания: покраснение и зуд век, ринорея, заложенность носа. Данная симптоматика обычно появляется после первого введения и уменьшается на фоне лечения. Для купирования следует использовать антигистаминные средства.

Вспомогательные вещества

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну вводимую дозу 0,5 мл, то есть, по сути, не содержит натрия.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Исследования взаимодействия не проводились.

Совместное применение с симптоматическими противоаллергическими препаратами (например, антигистаминными средствами, глюкокортикостероидами) может повысить переносимость пациентом иммунотерапии.

Необходимо учитывать прием бета-адреноблокаторов, поскольку в случае анафилаксии они могут взаимодействовать с лекарствами для неотложной помощи и повышать риск более тяжелых системных реакций. По возможности, бета-адреноблокаторы следует заменить на альтернативный препарат. Совместное применение с бета-адреноблокаторами, трициклическими антидепрессантами и ингибиторами моноаминоксидазы противопоказано, так как применение эпинефрина для купирования возможных анафилактических реакций у таких пациентов может привести к опасным для жизни побочным реакциям.

Последовательность действий для извлечения 1 дозы суспензии для подкожного введения:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.09.2026 № 18565
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- Следует извлечь флакон с препаратом Аллергарда из холодильника не менее чем за 20 минут до введения, чтобы препарат постепенно нагрелся до комнатной температуры. Нельзя нагревать флаконы или подвергать их воздействию микроволнового излучения.
- Тщательно встряхнуть флакон. Убедиться, что суспензия тщательно перемешана и однородна. Суспензия должна быть серовато-белого цвета, при стоянии разделяется на бесцветную прозрачную жидкость и рыхлый осадок белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании.
- Перед извлечением препарата Аллергарда из флакона, следует осмотреть флакон на предмет наличия механических включений или изменения цвета суспензии.
- Снять обкатку с флакона и обработать пробку салфеткой спиртовой.
- Подготовить шприц 1 мл и иглу стерильную одноразовую 21G для извлечения препарата из флакона.
- Из флакона аккуратно извлечь иглой 21G все количество препарата (весь возможный объем, т.е. максимально набрать суспензию из флакона в шприц).
- Заменить иглу, которой препарат набирался в шприц на стерильную одноразовую иглу для подкожного введения 26G.
- Излишки препарата удалить только через иглу для введения 26G так, чтобы в шприце осталось 0,5 мл.

Передозировка

Случаев передозировки препарата Аллергарда не зарегистрировано. Вероятность передозировки минимальна, один флакон препарат содержит одну дозу (0,5 мл), введение препарата производится только в лечебных учреждениях квалифицированным медицинским персоналом.